

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA REZONANSEM MAGNETYCZNYM (MR)



WAŻNE INFORMACJE



Na 3 godziny przed badaniem należy pozostać na czczo (można pić wodę).



Osoby, które przyjmują na stałe leki, powinny je zażywać tak jak zwykle.



Na badanie należy przyjść w odzieży niezawierającej elementów metalowych (guzików, nitów, zapięć, zamków błyskawicznych itp.).




Wskazane jest zabranie ze sobą cieplejszej odzieży, w pomieszczeniu z aparatem MR jest chłodno (15–20°C).



W wypadku badania ze środkiem kontrastującym konieczne jest posiadanie wyniku poziomu kreatyniny (nie starsze, niż 30 dni, a w przypadku występujących chorób nerek – nie starsze, niż 7 dni).



Na badanie należy przyjść co najmniej 15 minut przed wyznaczoną godziną, w celu wypełnienia ankiety medycznej.



W czasie trwania badania (20–60 min.) należy pozostać nieruchomo w jednej pozycji.



Do pomieszczenia z aparatem MR prosimy nie wносить metalowych przedmiotów, a w szczególności telefonów komórkowych, kart kredytowych, zegarków lub innych urządzeń elektronicznych.



Przed badaniem należy zdjąć takie przedmioty jak: okulary, biżuteria, zegarek, aparat słuchowy, protezy zębowe.

PRZECIWSKAZANIA DO BADANIA



Bezwzględne:

metalowe „magnetyczne” ciała obce w tkankach pacjenta (np. klipsy naczyniowe po operacjach laparoskopowych lub odłamki w sąsiedztwie naczyń, narządów miękkich, gałek ocznych; płytki ortopedyczne, itp.), niektóre klamry chirurgiczne, elektrostymulator serca, implanty wewnętrzne, wszczepione pompy insulinowe, klipsy metalowe, ciąża (I trymestr).



Względne:

ciąża (II i III trymestr), „magnetyczne” implanty trwale związane z układem kostnym, rozległe tatuaże w badanej okolicy, klaustrofobia oraz pompa insulinowa, która musi być odłączona na czas badania.

ZALECENIA – BADANIA SPECJALISTYCZNE



W przypadku badania **MR głowy** należy zmyć makijaż i nie stosować lakieru do włosów. Jeśli pacjentka posiada makijaż permanentny, powinna o tym poinformować technika obsługującego MR.



Badanie **MR jamy brzusznej i miednicy.**

Dodatkowo na 4 dni przed badaniem należy przejść na dietę lekkostrawną. W dniu badania przyjąć lek Espumisan, a także ziołowe środki przeczyszczające.



Badania **MR piersi** wykonywane są w 5–12 dniu cyklu. Konieczne jest dostarczenie wyniku badania biopsji, badań genetycznych, mammografii – jeżeli były wcześniej wykonywane. Nie należy używać antyperspirantów, balsamów, dezodorantów i perfum.

Badanie MR piersi powinno być wykonane 3 miesiące po zakończeniu HTZ (lub antykoncepcji hormonalnej), 6 miesięcy po biopsji gruboigłowej piersi oraz 12 miesięcy po zakończeniu radioterapii. Badanie odbywa się w pozycji leżącej na brzuchu.



Badanie **MR enterokinaza** (enterokliza/enterografia/enterokinaza)

Na 2 dni przed badaniem należy przejść na dietę lekkostrawną wyłączając mięso. Dzień przed badaniem od godz. 14:00 nie można jeść i należy rozpocząć picie roztworu Fortrans ~ 2 saszetki rozpuszczone w proporcji 1 saszetka na 1 litr wody. W dniu badania nie można jeść, ani pić. Osoby, które przyjmują leki na stałe powinny je zażyć popijając niewielką ilością wody. Na badanie należy przyjechać na 1,5 godz. przed planowaną godziną badania i zabrać 1,5 litra wody.

Konieczne jest posiadanie wyniku poziomu kreatyniny we krwi.

TRZEBA ZE SOBĄ ZABRAĆ...

- Dokument tożsamości.
- Skierowanie na badanie (nie jest konieczne w przypadku badań prywatnych).
- Wyniki wcześniejszych badań – płyty i opisy (np. USG, RTG, TK, MR, klisze, wypisy ze szpitala).
- W przypadku wszczepionych jakichkolwiek implantów należy dostarczyć dokumentację medyczną oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do badań. W przypadku stentów, by-pass musi upłynąć 6 tygodni od wszczęcia. Mając pewność, że wszczepiony element jest bezpieczny do wykonania badania MR, będzie można wykonać badanie.
- W przypadku badania ze środkiem kontrastującym konieczne jest posiadanie wyniku poziomu kreatyniny (nie starsze niż 30 dni, a w przypadku występujących chorób nerek nie starsze, niż 7 dni).

UWAGA



Jeśli podany był kontrast – w okresie 48 godzin po badaniu należy wypić w miarę możliwości więcej płynów obojętnych (1,5–2 litry).

Po badaniu z podaniem środka kontrastowego, kobieta karmiąca piersią, nie powinna karmić dziecka w ciągu najbliższych 24 godzin, a ściągnięty w tym czasie pokarm powinien zostać wylany.